



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ANTHRAX

โรคแอนแทรกซ์



1 เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง

ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในดินน้ำ และวัสดุจากพืช สัตว์ เชื้อทนความร้อน และเย็นได้ดีสปอร์ของเชื้อสามารถอยู่ในดินได้นานกว่า 10 ปี

2 การติดต่อของโรค



การสัมผัสสัตว์ หรือชำแหละสัตว์ ที่ป่วยหรือตาย จากโรคแอนแทรกซ์



การรับประทานเนื้อ สัตว์หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีเชื้อ



ติดจากการหายใจ เอาฝุ่นดิน หรือซากสัตว์ที่มีสปอร์ ของเชื้อเข้าไป

3 อาการของโรค



เจ็บคอ



คลื่นไส้



คอบวม



แผลดำ

4 กลุ่มเสี่ยง



- สัตว์แพทย์ สัตวบาล
- ผู้เลี้ยงสัตว์จำพวก โค กระบือ แพะ แกะ
- ผู้ทำงานในโรงฟอกหนังสัตว์ ขน หรือกระดูกสัตว์ปน

ผู้ชำแหละสัตว์และปฏิบัติงาน ในโรงฆ่าสัตว์

ผู้ที่ชอบรับประทานเนื้อดิบ

ผู้เข้า-ออก โรงฆ่าสัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์

5 การป้องกัน และดูแลตนเอง (ระยะ 1-5 วัน)



หลีกเลี่ยงการสัมผัส สัตว์พาหะนำโรค

ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ



ล้างมือชำระร่างกายให้สะอาด หลังสัมผัสสัตว์



เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง อาหารปลอดภัย



หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ห้ามชำแหละซากสัตว์



หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ เช่น ท้องเสีย หรือถ่ายเหลวปนเลือด, ไอ หรือหายใจติดขัด เป็นต้น

ข้อมูลจาก กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

I am Sorry!!!!



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

นายณฤช ไขษาศิวิไลซ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

