BENCHAKITTI PARK HOSPITAL

โรคพิษสุนัขบ้า
(Rabies)



อาการ

ระยะแรก :ไข้ต่ำๆ
ปวดศีรษะ เหนื่อย เบื่ออาหาร

ต่อมา : ชา ปวดแสบตรงบริเวณแผล

ระยะรุนแรง : กลัวน้ำ กลัวคน กล้ามเนื้อกระตุก สับสน ก้าวร้าว

ระยะสุดท้าย : ชัก หมดสติ และเสียชีวิตภายในไม่กี่วันหลังมีอาการ

การป้องกัน

พาสุนัข/แมว : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข/แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่รู้จัก

หากถูกกัด/ข่วน : ล้างแผลด้วยสบู่
ล้างแผลด้วยสบู่และให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที



การรักษา

ยังไม่มียารักษาเมื่อเริ่มมีอาการ
มีอัตราการเสียชีวิตเกือบ100%

ข้อสำคัญ: การป้องกัน และ การได้รับวัคซีนหลังถูกกัด คือ ทางรอดทางเดียว

ยังไม่มียารักษาเมื่อเริ่มมีอาการ
→ อัตราเสียชีวิตเกือบ 100%

หากถูกกัด/ข่วน
- ✓ ล้างแผลทันที
- ✓ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ✓ พิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลิน (Rabies Immunoglobulin) ในรายแผลเสี่ยงสูง



กรมปศุสัตว์

เฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า

ร่วมมือกันวันนี้ เพื่อคนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



1 พบสุนัขแปลกถิ่น ดุร้าย ไล่กัดคนและสัตว์เลี้ยง รีบแจ้ง!



แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันที

- ผู้นำชุมชน
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

2 พาสุนัขและแมว ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปีละ 1 ครั้ง



ในสัตว์ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

เข็มที่ 1 → ห่างกัน 1 เดือน → เข็มที่ 2

จากนั้นฉีดแค่ปีละ 1 ครั้ง

3 หากพบสัตว์เลี้ยง โดยสุนัขที่มีอาการผิดปกติ กัด ทำร้าย



ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปกระตุ้นวัคซีน



+ และรีบแจ้ง ผู้นำชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่



สิ่งที่ทุกคนทำได้

- ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง
- ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ
- ร่วมมือกันเพื่อชุมชนปลอดภัย

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้ ไม่ประมาท

ด้วยความห่วงใย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
044 - 666 332
www.saonongwang.go.th

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคพิษสุนัขบ้า



เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยง สุนัขและแมว





ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป
ปีแรก ฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี



ทำหมัน
ไม่ให้มีลูกมากเกินไป



เลี้ยงในรั้วบ้าน
ไม่ปล่อยไปเพ่นพ่าน
ในที่สาธารณะ



คนหรือสัตว์
เมื่อแสดงอาการจะ
ตายทุกราย!!



สุนัขหรือแมว ที่มีเจ้าของ
ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน



โรคนี้
ไม่ได้เป็น เฉพาะหน้าร้อน

เมื่อถูก สุนัขหรือแมว กัด ข่วน เลีย บาดแผล ต้องรีบ...



"ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบชุด"



ล้างแผล
ด้วยสบู่และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา
รักษาแผลสด



กักหมา
ไว้ดูอาการ 10 วัน
หากตายรีบแจ้งปศุสัตว์



หาหมอ
เพื่อรับการป้องกันโรค
และมาตามนัดทุกครั้ง

คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



อย่าแหย่ หรือเล่นกับสนัขแรงๆ ให้ตกใจ หรือโมโห



สุนัขให้ตกใจ **อย่าเหยียบ**



อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกัน



จานข้าวที่สุนัข หรือแมวกำลังกิน **อย่าหยิบ**



อย่ายุ่ง กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ

ทำบุญได้บาป



โปรด หยุด ให้อาหารแก่สุนัข หรือแมวจรจัด

เพราะอาจทำให้สุนัขหรือแมวจรจัดกัดกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และทำให้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการกัดคน และแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นด้วย

ด้วยความห่วงใย
044 - 666 332
www.saonongwang.go.th
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม